

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 20-5-70 069621

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION "ALSACE ET LORRAINE"

(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MEUSE, MOSELLE, VOSGES)

Cité Administrative — 67 - STRASBOURG

Tél. 34-14-63 = Poste 93

ABONNEMENT ANNUEL 25 F

C. C. P. STRASBOURG 55-08-00 F

Régisseur de recettes D. D. A.

2, Rue des Mineurs

67 - STRASBOURG

Supplément n° 3 au Bulletin du mois de Mai 1970

19 Mai 1970

Avertissement

## ARBRES FRUITIERS A PEPINS

### TAVELURES DU POMMIER ET DU POIRIER

En raison de l'accroissement rapide de la végétation, il est nécessaire de renouveler le traitement contre les Tavelures dans la période du 21 Mai au 22 Mai. La protection des arbres doit être maintenue d'une façon parfaite, d'autant plus que les premières taches sont apparues dans les vergers où les traitements conseillés précédemment ne purent se faire correctement (pluies fréquentes, sol détrempé).

Avoir soin d'apporter la quantité de produit nécessaire, sans pour autant augmenter les doses conseillées.

### OIDIUM DU POMMIER

Cette maladie est fréquente dans de nombreux vergers. Profiter de la lutte contre la Tavelure pour exécuter un traitement mixte.

Couper et brûler les pousses oïdiées.

Information

## ARBUSTES A PETITS FRUITS

- FRAMBOISIER -

### DESSECHEMENT DES RAMEAUX (Didymella applanata)

Prévoir, dès que possible, le renouvellement du traitement.

## VIGNE

### ROT-BRENNER

Cette maladie ne se manifeste que très localement. Dans les parcelles où l'on craint la manifestation de cette maladie, intervenir dès à présent, avec un produit à base de Cuivre, de Manèbe, de Mancozèbe ou un mélange Zinèbe - Cuivre, aux doses préconisées contre le Mildiou de la vigne.

### ARAIGNEES ROUGES

Favorisées par le temps chaud de ces derniers jours, les éclosions des oeufs d'hiver sont pratiquement terminées.

Les populations de jeunes larves sont importantes dans les parcelles mal protégées l'an dernier, et présentes dans des situations jusqu'ici épargnées.

Nous recommandons aux viticulteurs d'apporter un soin particulier à la reconnaissance de ce ravageur dans leur vignoble. Observer la face inférieure des feuilles avec une loupe, ou presser fortement les feuilles sur du papier blanc. Les larves écrasées seront parfaitement visibles sur cette surface blanche.

Un traitement aphicide devra être réalisé dès réception, en utilisant l'un des produits figurant sur la liste en votre possession.

Le Responsable de la Station  
D'Avvertissements Agricoles :  
C. GACHON.

L'Inspecteur de la  
Protection des Végétaux :  
J. HARRANGER.

80